

Matematisk induktion

1 Induktionsbeviser

Sætninger der udtaler sig om hvad der gælder for alle naturlige tal $n \in N$, kan undertiden bevises ved *matematisk induktion*.

Idéen bag induktionsbeviser er enkel: i stedet for at bevise sætningen for hvert enkelt n for sig fra en ende af (hvorved man jo skulle igennem uendelig mange beviser før man havde klaret alle de naturlige tal), beviser man bare to ting: a) at påstanden gælder for $n = 1$, og b) at man altid kan komme videre, dvs. at det for alle $n \in N$ gælder at *hvis* påstanden er sand for n , *så* er den også sand for $n + 1$.

At dette faktisk er en gyldig bevistype, er egentlig et *aksiom*, *induktionsaksiomet*, som er en del af fundamentet for den matematik vi beskæftiger os med til daglig.

For at vise hvordan et induktionsbevis typisk forløber, ser vi på følgende

Sætning. For alle naturlige tal $n \in N$ gælder formelen

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} .$$

Bevis. Vi beviser sætningen ved induktion. For $n = 1$ lyder sætningens påstand $1^2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$, og det er jo sandt. Hermed har vi sikret *induktionens start*.

Lad herefter n være et vilkårligt naturligt tal. Vi vil bevise at *hvis* formelen gælder for n , dvs. at *hvis*

$$(*) \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} ,$$

så gælder formelen også for $n + 1$, dvs. at så gælder

$$(**) \quad 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} .$$

Vi ser på venstre side af dette udtryk, udnytter *induktionsantagelsen* (*) og regner videre:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} = \frac{(n+1) [n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} . \end{aligned}$$

Hermed har vi bevist (**) ud fra (*), dvs. at *induktionsskridtet* er fuldført. Dermed er sætningen er bevist. \diamond

2 Opgaver

Formlerne i de første opgaver nedenfor er nyttige og velkendte (og kan i øvrigt bevises på mange andre måder end ved induktion).

Opgave 1 (Summen af de n første naturlige tal) Bevis ved induktion formelen

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Opgave 2 (Summen af de n første ulige naturlige tal) Bevis ved induktion formelen

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Opgave 3 (Summen af en endelig kvotientrække) Lad $q \neq 1$ være et tal. Bevis ved induktion at

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Opgave 4 (Antallet af delmængder af en n -mængde) Bevis ved induktion at antallet af delmængder af en n -mængde, $n \in \mathbb{N}$, er 2^n .

Opgave 5 Lad der være givet et liniestykke med længden 1, og lad n være et naturligt tal. Bevis at man med passer og lineal kan konstruere et liniestykke af længden \sqrt{n} .

Det er naturligvis en stor fordel at vide hvad man stiler efter at bevise. I praksis kender man ikke altid resultatet på forhånd. I de næste opgaver skal man først gætte en formel.

Opgave 6 (Summen af de n første kubiktal.) Gæt ved at prøve med små værdier af n et generelt udtryk for

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3.$$

Bevis derefter formelen ved induktion.

Opgave 7 Dag 1 om morgenen anbringes en abe på det nederste trin af en uendelig høj stige. Hver dag klatrer aben først op til trinnet dobbelt så højt oppe som det trin den startede på om morgenen, og derpå yderligere et trin op. På hvilket trin befinder aben sig om morgenen den n 'te dag?

Induktionens start behøver ikke at være $n = 1$.

Opgave 8 Bevis at vinkelsummen i en n -kant, $n \geq 3$, er $(n - 2)180^\circ$.

Også induktionsantagelsen kan varieres. Undertiden benyttes i induktionsskridtet ikke bare at påstanden antages at gælde for n , men at den antages at gælde for alle (eller udvalgte) tal op til og med n .

Opgave 9 Betragt *Fibonacci-tallene*

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots$$

der er defineret ved at $F_1 = 1$, $F_2 = 1$ samt

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Bevis ved induktion *Binets formel*, som siger at

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Somme tider kan induktion bruges i opgaver der som udgangspunkt slet ikke handler om alle de naturlige tal. De følgende opgaver bliver faktisk lettere hvis man gætter på at påstanden nok holder for alle naturlige tal, og derefter går efter at bevise dette mere generelle resultat.

Opgave 10 Lad a være et tal med den egenskab at tallet

$$a + \frac{1}{a}$$

er et helt tal. Bevis at også

$$a^{19} + \frac{1}{a^{19}}$$

er et helt tal.

Opgave 11 I et firma med 107 ansatte overvåger man hinanden på følgende måde: For ethvert par af ansatte gælder at enten overvåger den ene den anden, eller også overvåger den anden den ene. Bevis at der findes en ansat P med den egenskab at enhver anden person enten overvåger P eller overvåger en person der overvåger P .